

УТВЕРЖДАЮ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению
Инджектифос

(организация-производитель: CADILA HEALTHCARE LTD.
(DIV. ZYDUS ANIMAL HEALTH), INDIA)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Инджектифос. Международные непатентованные наименования: бутафосфан, цианокобаламин.
2. Лекарственная форма: раствор для инъекций. Инджектифос в 100 мл в качестве действующих веществ содержит бутафосфан – 10 г, цианокобаламин – 0,005 г, а также вспомогательные вещества: спирт бутиловый, воду для инъекций.
3. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость розового цвета.
4. Выпускают расфасованным в стеклянные флаконы по 100 мл, закупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками. Флаконы упакованы в картонные коробки вместе с инструкцией по применению.
5. Хранить при температуре от +5°C до +30°C, в недоступном для детей темном месте. Не допускается замораживание.
6. Не использованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
7. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

8. Инджектифос относится к комплексным лекарственным средствам, предназначенным для стимуляции обменных процессов и неспецифической резистентности у сельскохозяйственных животных, а также собак.
9. Инджектифос обладает тонизирующими свойствами, нормализует метаболические и регенеративные процессы, оказывает стимулирующее влияние на белковый, углеводный и жировой обмен веществ, повышает резистентность организма к неблагоприятным факторам внешней среды, способствует росту и развитию животных.
10. Инджектифос по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает местнораздражающего, сенсибилизирующего, эмбриотоксического, тератогенного, мутагенного и канцерогенного действия, не обладает кумулятивными свойствами.

III. Порядок применения

11. Инджектифос назначают сельскохозяйственным животным, пушным зверям, лошадям и собакам при нарушениях обмена веществ различной этиологии, а также в качестве стимулирующего и тонизирующего средства:

- нарушение обмена веществ, вызванное плохим кормлением, содержанием животных, различными заболеваниями;
- нарушения кормления, развития в следствие заболеваний при выращивании молодняка;
- для стимуляции родовой деятельности и как вспомогательное средство при лечении гипокальцемии;
- послеродовое заболевание, истощение, после тяжелых родов, а так же как вспомогательное средство при лечении бесплодия;
 - при титанических синдромах и парезах;
 - при ослабленном состоянии у животных;
 - при вторичных анемиях, анемиях при гельминтозах;
 - для повышения резистентности организма;
 - для повышения мышечной активности здоровых животных.

Кроме того, путем активации обмена веществ повышается сопротивляемость организма.

12. Противопоказанием к применению Инджектифос является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата.
13. При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами для животных.
14. Препарат рекомендуется к применению для стимуляции родовой деятельности и как вспомогательное средство при лечении гипокальцемии; при послеродовых заболеваниях, истощении, после тяжелых родов, а так же как вспомогательное средство при лечении бесплодия; при титанических синдромах и парезах; при ослабленном состоянии у животных (в том числе после родов). Особенности применения у лактирующих животных нет.
15. Инджектифос применяют сельскохозяйственным животным, пушным зверям, лошадям и собакам один раз в сутки внутримышечно, подкожно или внутривенно (медленно), в разовых дозах, указанных в таблице.

Вид животного	Доза (мл на животное)
Взрослые лошади и крупный рогатый скот	10 – 25
Жеребята, телята	5 – 12
Взрослые овцы и козы	2,5 – 8
Ягнята, козлята	1,5 – 2,5
Взрослые свиньи	2,5 – 10
Поросята-сосуны, подсвинки	1 – 2,5
Собаки	0,5 – 5
Кошки, пушные звери	0,5 – 2,5

16. При хроническом течении болезни назначают 1/2 дозы Инджектифос, указанной в таблице. Повторный курс лечения при необходимости проводят с интервалом 5 – 14 дней.
17. Побочных явлений и осложнений при применении Инджектифос в соответствии с настоящей инструкцией не наблюдается.

18. Симптомов передозировки при применении Инджектифос в соответствии с настоящей инструкцией не выявлено.
19. Применение Инджектифос не заменяет и не исключает использование антибактериальных и других средств этиотропной терапии.
20. Особенности действия лекарственного препарата при его первом применении не установлено.
21. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе по той же схеме.
22. Убой животных на мясо и использование в пищевых целях мяса, молока во время и после применения Инджектифос разрешается на общих основаниях.

Организация-производитель: CADILA HEALTHCARE LTD. (DIV. ZYDUS ANIMAL HEALTH), INDIA

Регистрационный номер РК-ВП-4-4064-19 от 09.09.2019 г