



Пневмотак **(Pneumotac)**

Раствор для инъекций

Для ветеринарного применения

Состав:

1 мл содержит:

Тилмикозина фосфат 333,828 мг (эквивалентный основанию тилмикозина 300 мг).

Свойства:

Тилмикозин – это новый макролидный антибиотик, родственник эритромицину.

Антибактериальное действие макролидных антибиотиков основывается на ингибировании синтеза белка посредством связывания с рибосомальной субъединицей 50S клеток бактерий.

Спектр антибактериального действия тилмикозина, в основном, включает в себя грамположительные микроорганизмы, но он также активен и против некоторых грамотрицательных микроорганизмов, включая виды *Pasteurella*. Также была обнаружена активность против нескольких видов **микрoплазм**.

Показания:

Применяется у крупного рогатого скота (КРС) и овец для лечения респираторного заболевания КРС (РЗКРС), ассоциированного с *Pasteurella haemolytica* и *Pasteurella multocida*.

Целевые виды животных: КРС и овцы (с массой тела более 15 кг).

Дозировка и применение:

Указания:

- Вводить подкожно.
- Применять в виде однократной подкожной инъекции.

КРС: 1 мл/30 кг массы тела

Овцы: 1 мл/30 кг массы тела

Не вводить инъекцию объемом более 15 мл в одно место.

Противопоказания:

1. Нельзя вводить с помощью автоматических шприцов.
2. Нельзя применять внутривенно у КРС. Внутривенная инъекция у КРС является смертельной.
3. Нельзя применять у коз.

Особые указания:

1. Безопасность тилмикозина не устанавливалась у беременных коров и животных, используемых для размножения и улучшения породы.
2. Внутримышечная инъекция может вызвать местную реакцию, которая может привести к потере равновесия и координации.
3. Нельзя применять у дойных коров возрастом 20 месяцев или старше.
4. Нельзя применять в КРС, используемого для получения молока для его употребления человеком, а также у телок в течение 60 дней после отела.

Побочные эффекты:

Временное опухание в месте введения инъекции.

Период(ы) выведения:

КРС: мясо – 60 дней

Овцы: мясо – 42 дня

молоко – 15 дней.

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 30°C, защищать от воздействия прямого солнечного света, и хранить в недоступном для детей месте.

* Срок годности препарата до момента его открытия составляет 3 года.

* Срок годности препарата после первого открытия контейнера составляет 3 месяца.

Упаковка и форма выпуска:

Флаконы из янтарного стекла, содержащие 10 мл, 25 мл, 30 мл, 50 мл, 100 мл и 250 мл, снабженные этикеткой, которые вместе с инструкцией-вкладышем по медицинскому применению лекарственного средства укладывают в картонную коробку.

Производитель: компания "ADWIA Co. S.A.E.", 10th of Ramadan City

Сделано в Египте