

**ТИЛОЗИНА ТАРТРАТ АДВИА  
(TYLOSIN TARTRATE ADWIA)  
Порошок пероральный**

**Для ветеринарного применения**

**Состав:**

**108 г содержат:**

Тилозина тартрат 108 г  
(эквивалентный тилозина основанию 100 г).

**Свойства:**

Тилозин представляет собой антибиотик, вырабатываемый штаммом *Streptomyces fradiae*, и он является актиномицетом. Тилозин связывается с рибосомой 50S и ингибирует синтез белков. Он является бактериостатическим антибиотиком. Спектр антибактериального действия тилозина охватывает, в основном, грамположительные микроорганизмы (виды *Staphylococcus*, виды *Streptococcus*, виды *Clostridium*), но он также активен и против некоторых грамотрицательных микроорганизмов. Было обнаружено, что он также активен против видов *Mycoplasma*.

**Показания:**

**Куры:**

Лечение хронического респираторного заболевания (ХРЗ), вызванного *Mycoplasma gallisepticum*, чувствительными к действию тилозина, у бройлеров и цыплят для восполнения поголовья.

**Индейки:**

Лечение инфекционного синусита, вызванного *Mycoplasma gallisepticum*, чувствительными к действию тилозина.

**Свиньи:**

Лечение дизентерии свиней, вызванной *Serpulina hyodseteriae* или другими

патогенными микроорганизмами, чувствительными к действию тилозина.

**Целевые виды животных:** Куры, индейки, свиньи.

**Режим дозирования:**

**Обобщенные указания:**

**Куры и индейки:**

Для приготовления раствора, содержащего 2 г/4 л (500 мг/л), перемешивают 100 г тилозина тартрата вместе с 200 литрами.

**Свиньи:**

Для приготовления раствора, содержащего 1 г/4 л (250 мг/л), перемешивают 100 г тилозина тартрата вместе с 400 литрами.

**Продолжительность лечения:**

**Куры и индейки:**

Лечение – вместе с питьевой водой в течение 3 дней в дозе 2 г/4 л (500 мг/л) или в течение 1 - 5 дней в зависимости от тяжести инфекции.

**Свиньи:**

Лечение – вместе с питьевой водой в течение 3 - 10 дней в дозе 1 г/4 л (250 мг/л).

При всех видах патогенных микроорганизмов, если улучшение не наблюдается в течение 5 дней, необходимо повторно подтвердить диагноз.

**Особые указания:**

1. Необходимо всегда добавлять воду в порошок.
2. Нельзя насыпать порошок в воду.
3. Необходимо приготавливать свежий раствор каждые 3 дня.
4. При перемешивании тилозина и выполнении других операций по обращению с ним, необходимо использовать защитную одежду и непроницаемые перчатки.
5. Вода, содержащая лекарственное средство, должна быть единственным источником питьевой воды в период лечения.

6. Нельзя применять препарат у птиц-несушек.

**Период выведения препарата из организма:**

**Мясо:**

**Куры:** 2 дня

**Индейки:** 5 дней

**Свиньи:** 2 дня.

**Условия хранения:**

Хранить при температуре не выше 30°C, защищать от воздействия прямого солнечного света, и хранить в недоступном для детей месте.

Препарат необходимо использовать сразу же после его разбавления.

**Срок годности:** 3 года.

**Форма выпуска / упаковка:**

Банка из полиэтилена высокой плотности, в которую уложен пакет из полиэтилена низкой плотности, содержащий 100 г, 200 г, 500 г и 1000 г, снабженная этикеткой, к которой приложена инструкция-вкладыш по медицинскому применению лекарственного средства.

**Производитель:**

Компания "АДВИА Ко. С.А.Е."

Адрес: 10 оф Рамадан Сити, Египет

**Сделано в Египте**