

СПЕКТО-Л (SPECTO-L)

Водорастворимый порошок для орального применения

Состав:

100 г содержат:

Линкомицина гидрохлорид.....33.3 г
Спектиномицина сульфата..... 66.7г

Фармакологическое действие

СПЕКТО-Л комбинированный препарат, который содержит два антибиотика. Линкомицин — это линкозамидный антибиотик. Имеет широкий спектр действия, действует на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, такие как: *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Bacillus anthracis*, *Corynebacterium spp.*, *Actinobacillus spp.*, *Bordetella spp.*, некоторые виды *Nocardia spp.* но *Actinomyces spp.* Особенно эффективен против *Serpulina hyodysenteriae* и *Mycoplasma spp.* Линкомицин вызывает ингибицию белкового синтеза на уровне рибосомной субъединицы 50S. Спектиномицин — это аминоциклический антибиотик. Действует преимущественно на грамотрицательные микроорганизмы, в том числе: *E. coli*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella spp.*, *Clostridium spp.*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Haemophilus spp.*, *Vibrio spp.*, а также *Mycoplasma spp.* Спектиномицин вызывает ингибицию белкового синтеза на уровне рибосомной субъединицы 30S. Линкомицин и спектиномицин действуют синергично *in vitro* против анаэробов в патогенезе дизентерии у свиней.

Показания к применению:

Свиньи: профилактика и лечение животных, больных микоплазмозом, колибактериозом, сальмонеллезом, дизентерией, а также при других заболеваниях органов пищеварительного канала и дыхания, которые вызваны микроорганизмами, чувствительными к линкомицину и спектиномицину.

Птицы (бройлеры, ремонтный молодняк птицы): профилактика и лечение птицы, больной хроническим респираторным заболеванием (ХРЗ), ассоциируемым с микоплазмой, коли инфекция и при других заболеваниях органов пищеварительного канала и органов дыхания, которые вызваны микроорганизмами, чувствительными к линкомицину и спектиномицину.

Способ применения и дозировка

Перорально с питьевой водой или с кормом 1 раз в сутки в дозе:
свиньи ;

средняя масса тела свиньи (кг) x 0,015 г/сутки в течение 5 – 7 дней .

(150г СПЕКТО-Л соответствует дозе на 10,000 кг массы тела в день в течение 5 – 7 суток).

птицы (бройлеры и ремонтный молодняк) ;

Средняя масса тела живой птицы(кг) x 0,225 г/сутки в течение 5 – 7 дней.

(СПЕКТО-Л расход препарата 500 -700 г на 1000 литров воды).

Индеек: Для профилактики аэросакулита:

Средняя масса тела живой птицы x 0,225 г/сутки в течение первых 3 – 5 дней.

Ежедневно готовят свежий раствор препарата. Срок годности: при смешивании препарата с кормом 24 - 36 часов; при растворении в воде -24 часа.

Противопоказания:

Повышенная чувствительность к линкомицину и спектиномицину. Не применять животным с нарушением функции почек. Не применять кролям, хомьякам, морским свинкам, коням и жвачным животным. Это может привести к тяжелым расстройствам пищеварительного канала. Не применять одновременно с эритромицином. Нельзя применять вместе с каолином, так как он понижает всасывание линкомицина. Не применять курам-несушкам, яйца которых предназначены для использования в еду людям.

Период выведения препарата из организма:

Свиньи: ноль дней.

Куры: 5 дней.

Условия хранения:

Спекто-Л хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте при температуре до +30°C. Хранить лекарственный препарат следует в местах, недоступных для детей.

Срок годности:

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения: 3 года с даты производства. Срок годности препарата после первого открытия контейнера составляет 6 месяцев. Запрещается использовать лекарственный препарат по истечению срока годности.

Неиспользованный до конца срока годности препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

Упаковка / форма выпуска:

«Спекто-Л», порошок для перорального применения выпускают расфасованным в полиэтиленовых банках в объеме 150 г и 300 г.

Производитель:

"ADWIA S.A.E.", 10th of Ramadan City.

Сделано в Египте